

0.9mm が違いを生みます!

# #LSSA[엘싸]

## 臨床ガイド カーフ

ニューポン

[ホームページ](#)

ニューポンは健康で美しい生活の波を起こすことです。

2021.09.15

V1.0

# コンテンツ

## 01 LSSA - ふくらはぎ

- キーワード
- 解剖学

## 02 手順

- デザイン
- 切開
- 潜入
- LSSAの彫刻
- 願望

## 03 ヒント

- 要点
- 質疑応答
- 準備
- アフターケア

## 04 B&A

- 子牛1

## ふくらはぎの脂肪彫刻

ふくらはぎは、運動と食事制限だけではサイズを小さくするのが難しい部位です。ふくらはぎの脂肪は内側と後部の表層に存在します。

従来の方法では、他の組織とその薄い層が損傷するため、この領域を治療するのは困難です。

ふくらはぎの脂肪吸引では、2つのポイントが重要です。

男性的なラインに見えるように処理しないでください。そして、ふくらはぎ全体の形状を考慮してください。細い足首と太ももを一緒に処理する必要がある場合があります。



## 子牛 - キーワード

より簡単に

表面層への容易なアプローチ

足首部分の簡単な処理

より安全

膝窩の神経に損傷なし

結果は均等。

もっと早く

あざや腫れがほとんどないか、ほとんどない

迅速な回復

## ふくらはぎ - 解剖学

ふくらはぎは強くて硬い筋肉と薄い脂肪層を持っています

外側腓腹筋の脂肪

筋肉と脂肪は共存する

主に治療する部位

太ももからふくらはぎまでの脚全体の形を考慮する

腓腹筋内側の脂肪

筋肉と脂肪は共存する

薄い表面脂肪層が1つだけある

カラスの足の姿勢では、内側の腓腹筋を詳細に観察し、脂肪彫

刻のデザインを作成できます



## ふくらはぎ - 解剖学

### ふくらはぎ後部

中間層と表層の脂肪が除去される

この部分に脂肪が付くことはほとんどない

アキレス腱は皮膚壊死が起こりやすいので注意が必要です

### 下前外側部

脂肪が多すぎない

スリムな体型にするために脂肪吸引を均等に行う



## 02手順 - ふくらはぎ

### カーフ - デザイン

カラスの足跡をデザインし、楽で安全なストロークのために余裕を持たせます

全体的にスリムな形状を考慮する



## 02手順 - ふくらはぎ

### ふくらはぎ - 切開

内側/外側顆粒層




## 02手順 - ふくらはぎ

### 子牛 - 侵入

ふくらはぎ1頭につき約300ccを注入します。

ガイドハンドを使用して、カニューレの先端が表層に浸透しているかどうかを確認します。

アキレス腱には注意してください。




## 子牛 - LSSA 彫刻

浅層の脳卒中。

足首周りをケアしてスリムな形を作りましょう。

湿らせたガーゼや生理食塩水を塗布します。

エンドポイントは、プローブの動きに抵抗がなくなるまで、または各ふくらはぎにつき 10 分です。




### ふくらはぎ - 吸引

マイクロカニューレを表層に使用します。

通常で速度で吸引します。

出血が起こった場合は、吸引を中止してください。

過剰に吸引しないでください。形状を考慮してください。



## 03 ヒント

### ふくらはぎ - キーポイント

カラスの足跡で筋肉と脂肪をチェックします。

浅腓骨神経には注意してください。

ふくらはぎには大きな脂肪がないので、大幅なサイズダウンは不可能です。

表層部の脂肪彫刻。

通常の間開部位は前果です。

太ももとふくらはぎの形を一緒に考えます。

## 子牛 – Q&A

Q: 子牛に注入する腫脹液の量はどのくらいですか？

A: 子牛1頭あたり通常300cc必要です。

Q: 出血や痛みはどうですか？

A: LSSAは局所麻酔が可能な程度に痛みと出血を軽減します。

Q: 時間を使った LSSA はどうですか？

A: LSSA プローブのストロークに抵抗がなくなるまで。通常は腫脹液 100cc あたり 1 分です。

## 03 ヒント

## 子牛 - 準備

コモンズ	浸潤	願望
腫れの解決策	2.0mm x 25cm 浸潤カニューレとハンドル	2.5mm吸引カニューレとハンドル
縫合糸セットとNo.11ブレード	50ccシリンジ (ルアーロック)	3.0mm吸引カニューレとハンドル
26G針	50ccシリンジ (浣腸用シリンジ)	4.0mm吸引カニューレとハンドル
4 x 4 ガーゼ	浸透ポンプ (ホースとハンドル)	吸引ポンプホースとハンドル
3φスキンプロテクター		
10cc, 20cc ルアーロックシリンジ		
消毒剤とドレープ		

## 03 ヒント

### ふくらはぎ – アフターケア

手術後すぐに弾性バンドを使用してください。

ドレーンは非常に重要です。(誤嚥が大きい場合には遅延縫合が使用されることがあります。)

約1週間後、縫合糸を抜くことができます。

手術後1週間後から5～6週間は、リンパ循環のためのマッサージを行ってください。

(より早い回復のために、エンダモロジー、RF、外部超音波などのボディケア機器を使用できます。)

手術後は十分な水分を摂取してください。

浮腫を軽減するために、手術後は簡単な散歩や運動を推奨します。

カーフ



before



after

1ヶ月

ありがとうございます。